

## **¿Quiénes tienen prioridad para recibir tratamiento con medicamentos antivirales para la influenza?**

Todas las personas enfermas de influenza se recuperarán sin complicaciones. Algunas personas que se encuentran en una situación de mayor riesgo en cuanto a sufrir complicaciones relacionadas con la influenza constituyen un grupo de prioridad para el tratamiento con medicamentos antivirales durante esta temporada. Entre ellos se incluye:

- Las personas con enfermedades más graves, tales como aquellas hospitalizadas con contagio posible o confirmado de influenza
- Personas con infección presunta o confirmada por influenza que están en mayor riesgo de desarrollar complicaciones
  - o Niños menores de 2 años de edad
  - o Adultos de 65 años de edad y mayores
  - o Mujeres embarazadas
  - o Personas con determinadas afecciones médicas o inmunosupresivas crónicas
  - o Personas menores de 19 años de edad que están recibiendo una terapia a largo plazo a base de aspirinas

Los niños de entre 2 y 4 años de edad tienen más probabilidades de requerir hospitalización o ser evaluados clínicamente de urgencia por el virus de la influenza en comparación con los niños más grandes, si bien el riesgo es mucho menor que en los niños menores de 2 años de edad. Los niños de entre 2 y 4 años de edad que no presentan afecciones de alto riesgo y que no están gravemente enfermos no necesitan realizar un tratamiento antiviral.

Los niños y adultos que presentan un posible contagio de influenza, que tienen síntomas de una enfermedad en el tracto respiratorio o presentan deterioro clínico también deben recibir una terapia empírica con antivirales de forma inmediata, sin importar su estado de salud previo o edad.

En base a las evaluaciones médicas, los médicos clínicos también pueden decidir no brindar tratamiento a algunas personas de estos grupos y/o tratar a personas que no han sido incluidas en tales grupos.